

## **COVID-19: Rodičia nájdú kompletné informácie na stránke pediatrov**

**Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším. Rodičia často nevedia ako postupovať keď ich dieťa ochorelo, nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom pomôžu. Nielen tie nájdú rodičia aj na internetovej stránke pediatrov.**

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová radí pri príznakoch ochorenia dieťa otestovať domácom testom a po pozitívnom výsledku kontaktovať pediatra a objednať ho na PCR test. **“Pozitívne testované dieťa s príznakmi musí mať pokojový režim, dostatočný príjem tekutín a zdravú stravu,”** uviedla MUDr. Elena Prokopová. Ako doplnila rodičia nájdú komplexné rady, odporúčania a informácie od detských lekárov na stránke [www.pediatridetom.sk](http://www.pediatridetom.sk). „**Na základe manuálu na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa rodič dokáže určiť, či postačuje domáca liečba, či treba kontaktovať lekára na ďalší deň, alebo či si zdravotný stav vyžaduje bezodkladné vyhľadanie urgentnej pomoci,**“ uviedla hlavná odborníčka ministerstva. Príznaky ochorenia sú rozdelené do troch farieb červenej, oranžovej a zelenej zóny. Na základe zaradenia dokáže rodič určiť závažnosť ochorenia a konáť. Toto rozdelenie je súčasťou dokumentu “Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospevajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19” zverejnenom na stránke MZ SR <https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-ambulancie/>.

## **MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA MLADŠIEHO AKO 3 MESIACE**

**PRE RODIČOV/OPATROVNÍKOV DETÍ (AJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19)**

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďalší postup.  
V žiadnom prípade však nenahradzajú lekárskie vyšetrenie a odporúčanie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

 <p><b>ČERVENÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK MÁ VAŠE DIEŤATKO KTORÝKOLVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Je strnulé, alebo sa minimálne pohybuje, alebo má záškly ramien, rúk alebo noh, ktoré neprestanú, keď ich chytíte rukami.</li><li>• Je opakovane ľažkou zo zobuduť, aj keď je čas na kŕmenie.</li><li>• Bleďá, mramorová koža, ktorá je nezvyčajne chladná.</li><li>• Teplota nad 38°C (neplati, ak bolo dieťa očkovane v predchádzajúcich 48 hodinach a nemá iné červené alebo oranžové príznaky – tedy kontaktovať telefonicky svojho primárneho pediatra).</li><li>• Suché plienky (dieťa nemôčí) viac ako 8 hodín.</li><li>• Výrazne stažené dýchanie, ktoré sa prejavuje neschopnosťou pit, robi si prestávky v sieti po niekoľkých hitoch, má nezvyčajne rýchle a plynké dýchanie, nevládze plakat, sú pritomné pauzy medzi nádychnmi viac ako 10 sekúnd, má výrazné trvalé piškanie na hrudi pri dýchaní.</li><li>• Modrástie sfarbenie okolo úst, alebo na končekoch prstov.</li><li>• Na koži nové fialové fliačky, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zaťačíte skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.</li><li>• Zvracanie zeleného obsahu.</li><li>• Ak máte obavy, že je Vaše dieťa v ohrození života.</li></ul> <p><b>BEZODKLADNE VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠI URGENTNÝ PRÍJEM ALEBO VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112, PRETOŽE VAŠE DIEŤA VYŽADUJE NEODKLADNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.</b></p>	 <p><b>ORANŽOVÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK MÁ VAŠE DIEŤATKO KTORÝKOLVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taženie dýcha, čo sa prejavuje roztahovaním nosových krídel (bočnej časti vchodu do nosa), vtahovaním krčnej jamky alebo svalov pod rebrami pri dýchaní, má neutichajúci dusivý kašľ, pripomínajúci štekanie.</li><li>• Nerná záujem o kŕmenie.</li><li>• Je nezvyčajne spavé alebo predráždené (nepretržite pláče a neviete ho utišiť).</li><li>• Známky dehydratácie – nedostatku tekutín (suché sliznice v ústach a suché pera, vpadnuté oči, nepriornosť slz pri dlhšom pláči, suché plienky posledných 6 hodín).</li><li>• Rýchlo sa zhoršujúca dojčenská žltička (žltá koža na tvári, hrdinu pripadne končatinách, žlté očné bielka).</li><li>• Triáska.</li><li>• Pretrívavajúce vracanie.</li><li>• Prítomnosť krvi v stolicu alebo moči.</li><li>• Ak máte obavy, že sa dieťatu rýchlo zhoršuje zdravotný stav.</li></ul> <p><b>BEZODKLADNE KONTAKTUJTE PRIMÁRNEHO PEDIATRA VÁŠHO DIEŤAŤA, PODĽA MOŽNOSTI VÁS OBJEDŇA NA VÝŠETRENIE ČO NAJŠKÔR, AK JE PO ORDINAČNÝCH HODINÁCH, VYHĽADAJTE AMBULANTNÚ POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU ALEBO URGENTNÝ PRÍJEM, PRÍPADNE VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112.</b></p> <p>Počas pandémie sa môže stať, že sa často dovoláte primárnemu pediatru za účelom konzultácie, ak sa nedovoláte a vásťmi dieťaťu sa pri viac ako 4 hodinach nezlepší zdravotný stav, alebo sa zhorší, vyhľadajte najbližší urgentný príjem alebo volajte na linku 155 alebo 112.</p>
 <p><b>ZELENÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK VAŠE DIEŤATKO NEMÁ Žiadne ČERVENÉ ALEBO ORANŽOVÉ PRÍZNAKY, A NASTALA NIEKTORÁ Z NASLEDUJÚCICH SITUÁCIÍ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dieťa je mladšie ako 2 týždne (ju dojčeného dieťata mladšie ako 3 týždne), vyzerá žlté, hlavne na tvári – ide o novorodenecu žltičku, veľmi pravdepodobne začne postupne ustupovať – otázky zodpovie Váš pediatr v rámci poradenej starostlivosti.</li><li>• Dieťa má častú, rôzne sfarbeniu stolicu - je primerané, keď má dieťa 4-6 plných plienok denne, stolicu môže mať v každej plieneke, alebo raz za 1-3 dni, v prípade dojčených detí aj raz za 1 týždeň, stolicu môže mať rôzne sfarbenie od žlté cez oranžovú až po zelenkastú, ak sa dieťa pekne kŕmi a pribera, nie je nevyhnutné vyhľadať lekárku.</li><li>• Dieťa má zvýšenú teplotu medzi 37°C a 38°C - skontrolujte dieťatko, či nie je prehratie z neprimeranej teploty v miestnosti, alebo neprimerane veľa oblečenie, alebo ak sa práve zobudilo po spánku: merajte (rozbalené z perinky) s odstupom 15-20 minút. Ak nameriate zvýšenú teplotu od 37,2°C do 38°C opakované počas niekoľkých hodín a dieťa nemá žiadne z červených alebo oranžových príznakov, dbajte na častejšie kŕmenie, sledujte močenie a kontaktujte svojho pediatra.</li><li>• Dieťa pekne piše obvyklé množstvo, budí sa na kŕmenie a pláče pri hiale, viete ho utišiť, ale máte otázky pre iné nezvyčajné prejavy, kontaktujte svojho pediatra v ordinačných hodinách.</li></ul> <p><b>UVEDENÉ PRÍZNAKY NEVYŽADUJÚ OKAMŽITÚ POMOC. V PRÍPADE OTÁZOK SA OBRAŤTE NA PRIMÁRNEHO PEDIATRA VÁŠHO DIEŤAŤA.</b></p> <p>Pri iných prízmach kontaktujte svojho primárneho pediatra za účelom konzultácie, určenia domácej liečby a ďalšieho postupu.</p>	<p><b>Preventívne postupy</b> </p> <p><b>Standardné postupy</b> </p>

Referencie:  
The Royal College of Paediatrics and Child Health:  
<https://www.rcpch.ac.uk/resource-centre-paramedic-teams-young-people-during-coronavirus-pandemic>  
Centres for Disease Control and Prevention:  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-novel-coronavirus/index.html>  
National Health Service <https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/>

## **MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA STARŠIEHO AKO 3 MESIACE**

**PRE RODIČOV/OPATROVNÍKOV DETÍ (AJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19)**

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďalší postup.  
V žiadnom prípade však nenahradzajú lekárskes vyšetrenie a odporúčanie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho  
primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

 <p><b>ČERVENÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK MÁ VAŠE DIEŤA KTORÝKOLVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bledá, mrázomorová koža, ktorá je nevyčítane chladná.</li><li>• Je výrazne spavé - čiže je ho prebudit, spi nevyčítane dlho a nepretržite, neodpovedá na podnety primerane ani počas spánku, takmer sa nehýbe a nenadvádzuje očný kontakt.</li><li>• Je neutiesňe nepokojný - nepretržite pláče, má nevyčítaný pisklavý pláč.</li><li>• Je zmätene, dezorientované, má nerozumiteľnú reč.</li><li>• Nepritomnosť močenia (suché plienky) u dieťaťa do roka veku viac ako 8 hodín, u dieťaťa do 3 rokov viac ako 12 hodín.</li><li>• Výrazne stažené dýchanie, ktoré sa prejavuje nepravidelným dýchaním, veľmi rýchlym a plytkým dýchaním mimo plácu, veľmi dlhými pauzami medzi nádychmi, „apaning“ po dychu, ak pre dýchaciu funkciu nedokáže suviše hovoriť, jest alebo píť, má výrazne trvalé piškanie na hrudi pri dýchaní.</li><li>• Modrasté sfarbenie okolo úst, alebo na končekoch prstov.</li><li>• Veľmi výrazná a neustupujúca bolest alebo tlak na hrudi.</li><li>• Záchrab kŕčov (rytmické zásahy celých končatín alebo celého tela s poruchou vedomia).</li><li>• Opakovane vyrvalo vracia a má výraznú bolest hlavy, má stuhnutú šiju (nedokáže predklátať hlavu).</li><li>• Nové fláčiky na koži, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatlačíte skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.</li><li>• Náhlé vzniknutá alebo výrazne sa zhoršujúca bolest v oblasti semenníkov u chlapcov.</li><li>• Dieťa utrpelo väčšiu úrazu, alebo si spôsobilo väčšie poranenie.</li><li>• Ak máte strach, lebo dieťa vyzerá veľmi choré a máte obavy, že je v ohrození života.</li></ul> <p><b>BEZODKLADNE VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠI URGENTNÝ PRIJEM ALEBO VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112, PRETOŽE VAŠE DIEŤA VYŽADUJE NEODKLADNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.</b></p>	 <p><b>ORANŽOVÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK MÁ VAŠE DIEŤA KTORÝKOLVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ťažké dýcha, čo sa prejavuje roztažovaním nosových kridiel (bočné časti vchodu do nosa), vlnováním krčnej jamky alebo svalov pod rebrami pri dýchaní, nieve sa zhrubia nadýchnut, rýchlosť dýcha (viac ako 50/minút vo veku 3-12mesiacov, viac ako 40/min vo veku 1-5 rokov, viac ako 30/min vo veku 6-11 rokov, viac ako 20/min nad 12 rokov), má neutichajúci dusivý kašel, pripomínajúci ťekanie.</li><li>• Nezaujíma sa o kŕmenie.</li><li>• Je nevyčítane spavé alebo predtrždené (nepretržite pláče a neviete ho utišiť).</li><li>• Známky dehydratácie - nedostatku tekutin (suché sliznice v ústach a suché perly, vpadnuté oči, nepritomnosť sлиз pri dlhšom pláči, nepritomnosť močenia (suché plienky) u dieťaťa do roka posledných 6 hodín, u dieťaťa do 3 rokov posledných 10 hodín, u starších detí viac ako 12 hodín).</li><li>• Rýchlo sa zhoršujúca dojčenská žltákočka žltá koža na tvári, hrudníku pripadne končatinách, žlté očné bielek).</li><li>• Teplota nad 38°C viac ako 5 dní, alebo teplota nad 40°C viac ako 1 deň alebo teplota nad 39°C ak neodpovedá na liečbu liekmi proti teplote, u detí do 12 mesiacov pri teplote nad 38°C viac ako 24 hodín.</li><li>• Tráška viac ako 30 minút.</li><li>• Bolest hlavy a svedloplachosť, nemožnosť hýbať šijou („stuhnutá“ šija).</li><li>• Výrazná bolest hrdla a výrazné sŕmenie a neschopnosť hľadať tekutiny pri vysokej teplote.</li><li>• Pretrvávajúca vracanie.</li><li>• Prilomnosť krv v stolici alebo moči.</li><li>• Výrazná bolest svalov a zároveň neschopnosť chodiť alebo hýbať končatinami.</li><li>• Ak máte obavy, že sa dieťaťu rýchlo zhoršuje zdravotný stav.</li></ul> <p><b>BEZODKLADNE KONTAKTUJTE SVOJHO PRIMÁRNEHO PEDIATRA, OBJEDNÁVAJTE DIEŤA NA VYŠETRENIE ČO NAJSKÔR. AK JE PO ORDINAČNÝCH HODINÁCH, VYHĽADAJTE AMBULANTNÚ POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU, PRÍPADNE VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112.</b></p> <p>Počas pandémie sa môže stať, že sa ťažké dovoľte primárnemu pediatrovi za účelom konzultácie. Ak sa nedovoľíte a vásme dieťaťu sa po viac ako 4 hodinach nestupí zdravotný stav, alebo sa stav zhorší, vyhľadajte najbližší urgentný prijem alebo volajte na linku 155 alebo 112.</p>
 <p><b>ZELENÁ ZÓNA</b></p> <p><b>AK VAŠE DIEŤA NEMÁ Žiadne ČERVENÉ ALEBO ORANŽOVÉ PRÍZNAKY, DIEŤA OŠETRUJTE DOMA PODĽA POTREBY A PODZORUJTE VÝSKYT AKÝCHKOLVEK NOVÝCH PRÍZNAKOV, PRÍPADNE KONTAKTUJTE SVOJHO PRIMÁRNEHO PEDIATRA PRE KONZULTÁCIU OHĽADNE DOMÁCEJ LIEČBY A ĎALŠIEHO POSTUPU.</b></p>	

Referencie:  
The Royal College of Paediatrics and Child Health  
<https://www.rcpch.ac.uk/communicating-parents-young-peoples-during-coronavirus-pandemic>  
Centre for Disease Control and Prevention  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-novel-coronavirus/pediatric-faq.html>  
National Health Service <https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/>



## MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DOPIEVAJÚCEHO

PRE RODIČOV/OPATROVNÍKOV/DOPIEVAJÚCICH (AJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19)

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďalší postup.  
V žiadnom prípade však nenahradzajú lekárskie vyšetrenie a odporúčanie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho  
primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

 <b>ČERVENÁ ZÓNA</b>	<p><b>AK MÁ DOPIEVAJÚCI KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bledá, mramorová koža, ktorá je nezvyčajne chladná a pritom spojená.</li><li>• výrazne stažené dýchanie, ktoré sa prejavuje nepravidelným dýchaním, veľmi rýchlym dýchaním, "Japaním" po dchu, ak pre dýchavosť nedokáže súvisi hovoriť, jest alebo plí.</li><li>• Šedo-modré sfarbenie kože okolo úst, na tvári alebo na končekoch prstov.</li><li>• Veľmi výrazná neustupujúca bolest alebo tlak na hrudi.</li><li>• Zachvát kŕčov (rytmické záškby celých končatín alebo celého tela s poruchou vedomia).</li><li>• Zmatenosť a dezorientovanosť (ak reaguje zmatene, alebo neprimerane na podnety, alebo nereaguje vôbec), nedokáže zrozumiteľne hovoriť, čiť milobky a výrazne závrate.</li><li>• Neutrálné vracanie a výrazná bolest hlavy.</li><li>• Nový flacík na koži, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatačíte skleneným polohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.</li><li>• U chlapcov náhle vzniknútá alebo výrazná sa zhoršujúca bolesť v oblasti semenníkov.</li><li>• Ak vykaňlava krvavé hľeny.</li><li>• Utrel výrazný úraz alebo si spôsobil vážne poranenie.</li></ul>	<p><b>BEZODKLADNE VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠI URGENTNÝ PRÍJEM ALEBO VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112, PRETOŽE DOPIEVAJÚCI VYZÁDŽUJE NEODKLADNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.</b></p>
 <b>ORANŽOVÁ ZÓNA</b>	<p><b>AK MÁ DOPIEVAJÚCI KTORÝKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tažie dýchanie, ale stále môže hovoriť v celých vrátkach a môže jesť a piť bez výrazného zadýchania.</li><li>• Známky dehydratácie – nedostatku tekutín (pocit výrazného smädu, vpädnuté oči, suché sliznice v ústach a suché popraskané perly, ak nebolo močenie viac ako 12 hodín).</li><li>• Triačka alebo bolesť svalov bez zjavnéj príčiny (tie po cvičení, športovej námahe).</li><li>• Teplota nad 38,5°C, trvajúca viac ako 5 dní, teplota nad 40°C viac ako 3 dni, alebo teplota nad 39°C ak neodpovedá na liečbu liekmi proti teplote.</li><li>• Zhoršujúca sa bolesť hlavy a pretrvávajúce vracanie.</li><li>• Pretrvávajúca alebo zhoršujúca sa bolesť brucha.</li><li>• Prítomnosť krvi v stoličke alebo moči.</li><li>• Výrazný nezvyčajný trvajúci smäd napriek príjmu veľkého množstva tekutín a nezvyčajne časté močenie.</li><li>• Úraz končatín, ktorý spôsobuje zniženú hybnosť alebo pretrvávajúcu bolesť.</li><li>• Úraz hlavy s pretrvávajúcou bolesťou hlavy a spavosťou až miodlami.</li><li>• Ak sa čili stále horšie a máte veľké obavy o jeho zdravotný stav.</li></ul>	<p><b>BEZODKLADNE KONTAKTUJTE PRIMÁRNEHO PEDIATRA DOPIEVAJÚCEHO ALEBO VŠEGBECNÉHO LEKÁRA, KTORY OBJEDNÁ DOPIEVAJÚCEHO NA VYŠETRENIE ČO NAJSKÔR, AK JE PO ORDINAČNÝCH HODINÁCH, VYHĽADAJTE AMBULANTNÚ POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU, PRÍPADNE VOLAJTE LINKU 155 ALEBO 112.</b></p> <p>Počas pandémie sa môže stat, že sa túži dovoliť primárnemu pediatovi alebo všeobecnému lekárovi za účelom konzultácie. Ak sa nedovoľí a Vášmu dieťaťu sa po viac ako 4 hodinách nezlepí zdravotný stav, alebo sa zhoršuje, vyhľadajte najbližší urgentný príjem alebo volajte na linku 155 alebo 112.</p>
 <b>ZELENÁ ZÓNA</b>	<p><b>AK NEMÁ DOPIEVAJÚCI ŽIADNE ČERVENÉ ALEBO ORANŽOVÉ PRÍZNAKY, MÁ ZOSTAŤ DOMA DO ZOTAVENIA A MÁ POUŽÍVAŤ BEŽNÚ PODPORNÚ LIEČBU PODĽA PRÍZNAKOV. AK MÁTE OTÁZKY A POTREBUJUJETE SA PORADIŤ, KONTAKTUJTE PRIMÁRNEHO PEDIATRA DOPIEVAJÚCEHO ALEBO VŠEGBECNÉHO LEKÁRA. POZORUJTE VÝSKYT AKÝCHKOĽVEK NOVÝCH PRÍZNAKOV.</b></p>	

Referencie:  
The Royal College of Paediatrics and Child Health  
<https://www.rcpch.ac.uk/resourcecentre/patient-young-people-during-coronavirus-pandemic>  
Centres for Disease Control and Prevention  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-novel-coronavirus/index.html>  
National Health Service <https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/>

